

胃 X 線検査安全基準簡易一覧

消化管疾患	腸閉塞、腸ねん転の既往	原則的に不可 但し主治医の許可があれば可
	炎症性疾患	潰瘍性大腸炎、クローン病の治療中は不可
	上部消化管疾患	潰瘍、急性胃炎の治療中は不可
	消化管手術の既往	手術後 1 年以内は不可 但し主治医の許可があれば可
	大腸ポリープ	過去 2 か月以内に切除した場合は不可
	大腸憩室	憩室炎なければ可
	便秘	3 日間排便なければ不可
	下痢	炎症性腸疾患、感染性腸炎が疑われる場合は不可
循環器疾患	虚血性心疾患	1 年以内に発作があった場合は不可
	心不全	水分摂取制限ある場合不可
	心疾患術後	手術後 1 年以内は不可 但し主治医の許可があれば可
	ペースメーカー・ICD	不可
	高血圧	180/110 mmHg 以上は不可
	大動脈瘤・解離（胸・腹部）	主治医の許可があれば可 但し、当日の問診、検査等で腹部大動脈瘤が 40mm 以上ある場合は不可
呼吸器疾患	喘息	発作時は不可 頻繁に発作がある場合も不可
	呼吸器疾患	在宅酸素療法の方は不可
	手術の既往	手術後 1 年以内は不可 但し主治医の許可があれば可
脳血管障害	脳血管障害	1 年以内に発作があった方は不可
	頭部手術の既往	手術後一年以内は不可 但し主治医の許可があれば可
	脳圧亢進でシャント中	可
	認知症	理解困難がある場合不可
	てんかん	1 年以内に発作があった場合は不可
運動障害	麻痺、疼痛など	体位変換が困難な場合不可
	手術の既往	手術後 1 年以内は不可 但し主治医の許可があれば可
	椎体、じん帯など治療中	体位変換が困難な場合不可
	体型	130 キロ以上の場合安全を確保できないため不可
腎疾患	透析中	不可
	慢性腎疾患	水分摂取制限のある場合不可

糖尿病	経口血糖降下剤、インスリン	検査当日使用した方は不可
	インスリンポンプ、リブレ等	ご自分で外せない方は不可
その他	妊娠またはその可能性	不可
	誤嚥の既往	既往がある方は不可
	アレルギー	バリウム、発泡剤でアレルギーがある場合不可
	メニエール病	当日の状態で判断
	胸、腹部手術の既往	手術後 1 年以内は不可 但し主治医の許可があれば可
	飲水摂取	2 時間前まで 2 0 0 ml 以内の水であれば可